

ArgiMent® AT



ARGUMENT AT		SABOR NARANJA
PORCIONES POR SOBRE: 1		
CANTIDAD POR PORCIÓN: 42.75G		
Calorías: 120		
DATOS NUTRICIONALES		% del Valor Diario*
Grasas totales	0 g.	0%
Grasas saturadas	0 g.	0%
Grasas trans	0 g.	0%
Colesterol	25 mg.	8%
Sodio	40 mg.	2%
Potasio	87 mg.	2%
Fósforo	35 mg.	2%
Total Carbohidratos	6 g.	2%
Fibra dietaria	<1 g.	3%
Azúcares totales	6 g.	
Azúcares añadidos	5 g.	10%
Proteína	10 g.	
Vitamina D	0 mg.	0%
Calcio	83 mg.	6%
Hierro	0 mg.	
Vitamina C	250 mg.	280%
Zinc	12.5 mg.	110%
Cobre	1 mg.	110%
L-Arginina	7 g.	
L-Glutamina	7g.	

*El % del valor diario (VD), indica la cantidad de nutriente de una porción basada en una dieta de 2000 calorías diarias.

PARA HERIDAS CRÓNICAS Y AGUDAS

10 G DE PROTEÍNA

120 CALORÍAS

Nutrición avanzada para el manejo de las lesiones por presión y heridas quirúrgicas.



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Cada sobre tiene 42.75 g.

INGREDIENTES	CANT. SOBRE	%
Proteína de suero concentrada	12.859 g.	30.08%
L-Arginina	7.759 g.	18.15 %
L-Glutamina	7.759 g.	18.15 %
Fructuosa	3.848 g.	9.00 %
Ácido cítrico	3.721 g.	8.70 %
Polvo de jugo de naranja	3.420 g.	8.00%
Bimuno	1.92 g.	4.5 %
Sulfato de Zinc	0.034 g.	0.08 %
Gluconato de Cobre	0.007 g.	0.017 %



ArgiMent[®] AT

EXCIPIENTES: Sabor a naranja, ascorbato de calcio y sucralosa.

FORMA FARMACÉUTICA: Polvo para solución Oral.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: ArgiMent AT es un suplemento dietético.

PREPARACIÓN Y FÓRMULA DE DOSIFICACIÓN:

La ingesta regular de la bebida instantánea de ArgiMent AT es solo para adultos, y la misma debe ser de dos paquetes por día. Sin embargo, la dosis puede variar de acuerdo con las necesidades individuales. La evaluación debe ser hecha por un especialista de salud calificado.

- ORAL: Mezcle un paquete de ArgiMent AT con 180 a 240ml de agua. Agitar enérgicamente y servir inmediatamente.

- ALIMENTACIÓN POR Sonda: Enjuagar el tubo de alimentación con 30ml de agua. Mezclar un paquete de ArgiMent AT en al menos 120 ml de agua, agitar enérgicamente e infundir con una jeringa por la sonda de alimentación. Enjuagar bien el tubo con 30ml adicionales de agua. Continuar la alimentación por sonda como se prescribe *Para las personas osmóticamente sensibles, la tasa de ingesta debe ser lenta al principio y debe incrementarse gradualmente, conforme a la tolerancia del paciente.*

CONTRAINDICACIONES:

Los suplementos de arginina y glutamina no se recomiendan para las siguientes condiciones:

- Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Disfunción hepática o renal.
- Hipotensión
- Shock séptico
- Paciente con tratamiento con Interleuquina-2 (IL-2)
- Cirrosis

Otras enfermedades relacionadas con la retención de amoníaco.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:

Sólo debe usarse bajo estricta supervisión médica. No está diseñado para su uso como única fuente de nutrición. No es para uso parenteral. En todos los casos, la cantidad para el consumo debe ser determinada por los requerimientos de cada paciente.

- Para los pacientes con insuficiencia renal y que aún no están en diálisis, la función renal debe ser controlada adecuadamente durante la ingesta de ArgiMent AT.

- Debido al contenido de nitrógeno ArgiMent AT, es importante mantenerse hidratado.

- Este producto contiene leche por lo cual se debe usar con precaución en pacientes con intolerancia a la lactosa.

PEDIATRÍA: Estudios propiamente realizados hasta la fecha no han demostrado problemas específicos en pediatría que limiten la utilidad de la alimentación enteral en niños, sin embargo, se sabe que los niños de hasta un año, tienen sistemas gastrointestinales hepáticos y renales inmaduros, los cuales pueden determinar el tipo de fórmula enteral que el bebé debe recibir. Los pacientes pediátricos pueden tener también sensibilidad a la leche y trastornos metabólicos.

GERIATRÍA: Los estudios realizados hasta la fecha indican que los ancianos pueden tener un mayor riesgo de desarrollar problemas con la sonda nasogástrica, tales como neumonía por aspiración, especialmente por el uso prolongado de la alimentación enteral. Los ancianos también son más propensos a quitarse la sonda nasogástrica.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS U OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Hasta la fecha, no se ha reportado ninguna interacción con otros medicamentos.

FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA:

No hay datos disponibles sobre la utilización de ArgiMent AT en mujeres embarazadas o en período de lactancia. Este tipo de tratamiento puede ser necesaria durante el embarazo o la lactancia, por lo cual sólo debería ser administrado a mujeres embarazadas o en período de lactancia, después de una exhaustiva evaluación médica.

REACCIONES ADVERSAS Y SOBRE DOSIS:

En caso de sobre dosis y reacciones adversas al producto, suspender el tratamiento y acudir a su instalación de salud más cercana.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Manténgase a una temperatura entre 15° y 30°C.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

Es de dos años a partir de la fecha de fabricación. La fecha de vencimiento está especificada en el sobre. Una vez reconstituida, la solución no utilizada debe ser refrigerada y usada dentro de las 48 horas después de su preparación.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



FABRICADO POR: MEDTRITION INC
ESTADOS UNIDOS



IMPORTADO POR: MEDICAL NUTRICIÓN SAC
RUC: 20518874684 REGISTRO SANITARIO N°: DE-3901



01 466 2606

enteral@medicalnutricion.com

933 474 145

www.medicalnutricion.com